

農薬登録情報8月号



平成21年7月2日付

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容	
ウララDF	石原バイオサイエンス(株)	トマト	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	作物名の追加	
		ミニトマト	コナジラミ類	2000倍						
		ねぎ	ネギアザミウマ	1000～2000倍						
		すいか キャベツ はくさい	アブラムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内			
		小粒核果類 (うめを除く)								
		ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1000倍	開花前まで					
アクトラ顆粒水溶剤	シンジエンタジャパン(株)	だいこん	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	作物名の追加	
		ミニトマト	オンシツコナジラミ	2000倍		収穫前日まで	2回以内			
		ほうれんそう	アブラムシ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内			
		とうがらし類 (ししとうを除く)	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	3回以内			
		ししとう	アブラムシ類 コナカイガラムシ類 マメハモグリバエ	3000倍		収穫前日まで	3回以内		2回以内	使用時期の変更
		非結球 あぶらな科葉菜類 (こまつな、ケール、チンゲン サイを除く)	アブラムシ類	2000倍		収穫3日前まで				
		こまつな								
		チンゲンサイ								
		わけぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内	作物名の追加

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容
ラグビーMC粒剤	石原バイオサイエンス(株) 日産化学工業(株)	みずな	ネコブセンチュウ	20kg/10a	播種前	1回	全面処理土壌混和	作物名の追加
		ピーマン			定植前			
		ししとう			播種前			
		ごぼう	ネグサレセンチュウ		播種前		播溝処理土壌混和	

農薬登録情報8月号



平成21年7月8日付

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容
サイハロン乳剤	シンジエンタジャパン(株)	豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)	アブラムシ類	4000倍	-	収穫3日前まで	3回以内	散布	作物名の追加
オルトラン水和剤	アリストライフサイエンス(株)	やまのいも	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	1000倍	-	収穫45日前まで	1回	散布	適用害虫名の追加
トレボン乳剤	三井化学アグロ(株) 日産化学工業(株)	あしたば	アブラムシ類	2000倍	-	収穫14日前まで	3回以内	散布	作物名の追加
		豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)	マメシクイガ、アブラムシ類、シロイチモジマダラノメイガ、ダイズサヤタマハエ、カメムシ類、フタスジヒメハムシ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、フキノメイガ	1000倍	-	収穫14日前まで	2回以内	散布	作物名の分離
		だいず	マメシクイガ、アブラムシ類、シロイチモジマダラノメイガ、ダイズサヤタマハエ、カメムシ類、フタスジヒメハムシ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、フキノメイガ、ウコンノメイガ						作物の分離 適用害虫名の追加
		えだまめ	ウコンノメイガ						適用害虫名の追加

平成21年7月22日付

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容
モンカットベフランフロアブル	日本農薬(株) 日本曹達(株)	小麦	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	4倍	800ml/10a	根雪前	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	使用方法の追加
モスピラン水溶剤	日本農薬(株) 日本曹達(株)	ほうれんそう	アブラムシ類	8000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	使用時期の変更
コロマイト乳剤	三井化学アグロ(株)	せんぶり	シクラメンホコリダニ	1000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	作物名の追加
		きく(葉)	ハダニ類	1500倍		収穫前日まで	2回以内		適用害虫名の追加
		きく		-		-	-		
アルパリン顆粒水溶剤	三井化学アグロ(株) アグロカネショウ(株)	いね科牧草	アブラムシ類	2000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	適用害虫の追加
		きく	カメムシ類	2000倍		発生初期	4回以内		適用害虫名の変更
アミスター207フロアブル	シンジエンタジャパン(株)	はくさい	白斑病	2000倍	100~400L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	適用病害名の追加
		にんにく	葉枯病				3回以内		
		実えんどう	菌核病 褐紋病				3回以内		
		だいこん	ワッカ症				3回以内		
		せんぶり	さび病				3回以内		
インターフロアブル	ダウ・ケミカル日本(株)	ぶどう	灰色かび病	8000倍	200~700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	適用病害名の追加
		うめ	すす斑病	5000倍		収穫前日まで	2回以内		

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容
プリンス粒剤	日産化学工業(株)	キャベツ	ハイマダラノメイガ	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30x60cm使用土壌約3~4ℓ) 1箱当り20~30g	は種時~定植前	1回	本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する	使用時期の変更
			ハイマダラノメイガ	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30x60cm使用土壌約3~4ℓ) 1箱当り30g	は種前			本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの床土に均一に混和する