

農薬登録情報10月号



※記載内容に誤りが無い様、極力注意しておりますが、農薬の使用にあたっては必ず商品ラベルの表示を確認し、ラベルの記載どおりに使用して下さい。

平成21年9月2日付

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容
トップジンM水和剤	日本曹達(株) 日本農薬(株)	にら	白斑葉枯病、乾腐病	1000倍	-	収穫21日前まで	1回	1㎡当り3L灌注	使用時期の変更
		小麦	雪腐大粒菌核病	500倍	25L/10a	根雪前	3回以内(出穂期以降は2回以内)	散布	希釈倍数、 使用液量の追加
赤かび病	250倍		収穫14日前まで						
ベフトップジンフロアブル	日本曹達(株)	小麦	うどんこ病	800~1000倍	60~180L/10a	収穫14日前まで	3回以内(出穂期以降は1回以内)	散布	希釈倍数の変更
			赤かび病	8倍	0.8L/10a			無人ヘリコプターによる散布	使用方法の変更
バリダシン液剤5	住友化学(株)	ねぎ	苗立枯病(リゾクニア菌)	400倍	-	は種時	1回	1㎡当り6L灌注	作物名の追加
ロブール水和剤	バイエルクロップサイエンス(株)	スッキーニ	灰色かび病	1000~1500倍	-	収穫前日まで	4回以内	散布	適用作物の追加
		とうがらし類(ししとうを除く)		2000倍	-	収穫3日前まで	2回以内		
		ししとう			-	収穫前日まで	2回以内		
		アスパラガス			-	収穫前日まで	5回以内		
アミスターオプティフロアブル	シンジエンタジャパン(株)	にんじん	菌核病	1000倍	100~400L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	適用病害虫名 の追加
		メロン				収穫3日前まで	4回以内		
		すいか	褐色腐敗病			収穫前日まで	2回以内		
		トマト	すすかび病			収穫7日前まで	2回以内		
		ミニトマト	炭疽病			収穫前日まで	3回以内		
		ピーマン							
シクロパック粒剤	日本農薬(株) バイエルクロップサイエンス(株)	稲	イネミスゾウムシ、イネトロイムシ、 イネゾウムシ、イナゴ類	使用量: 小包装(パック)10個(600g)/10a		収穫60日前まで	2回以内	水田に小包装(パック) のまま投げ入れる。	使用回数の変更

平成21年9月16日付

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	10a当り使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容
テナホーン5%バイト	日本農薬(株)	はくさい	ハスモンヨトウ、ネキリムシ類	3~6kg	収穫21日前まで	3回以内	株元散布	使用時期、 使用方法の変更
			コオロギ、ダンゴムシ	3~4kg				
		だいこん	ネキリムシ類	3~6kg	収穫30日前まで	4回以内		使用時期、本剤の使用回数、 使用方法の変更
グリーンバイト	サンケイ化学(株)	はくさい	ダンゴムシ、コオロギ、 ナメクジ類、カタツムリ類	3~4kg(1㎡当り3~4g)	収穫21日前まで	3回以内	本剤を約30粒ずつまとめて、 1㎡当り4~5ヶ所の割合で適宜配置する	使用時期の変更

平成21年9月16日付

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	NACを含む農薬の総使用回数	変更の内容	
マイクロテナホーン水和剤85	日本農薬(株) 日産化学工業(株)	りんご	モモシクイガ	700~1300倍	収穫45日前まで	1回	散布	3回以内(満開後4週 間目以降は1回以内)	使用時期、本剤の使用 回数、NACを含む 農薬の総使用回数 の変更	
			ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ	1000~1500倍						
			シャクトリムシ	1300倍						
			ギンモンハモグリガ	1200倍						
		ぶどう	ブドウスカシバ、クロヒメゾウムシ、コガネムシ類	1000倍	収穫60日前まで	1回				
		りんご(使用目的: 摘果)	-	1200倍	満開後2~3週間頃	2回以内				本剤の使用回数、NACを含む農 薬の総使用回数の変更
		はくさい	ヨトウムシ、アオムシ、ハスモンヨトウ	800~1000倍	収穫21日前まで	3回以内				3回以内
キャベツ	ヨトウムシ、アオムシ、ハスモンヨトウ	1000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	希釈倍数の変更				

農薬登録情報10月号



※記載内容に誤りが無い様、極力注意しておりますが、農薬の使用にあたっては必ず商品ラベルの表示を確認し、ラベルの記載どおりに使用して下さい。

平成21年9月28日付

商品名	販売会社	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	変更の内容	
アクセルフロアブル	日本農薬(株)	キャベツ、はくさい	コナガ	1000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	新規登録	
フレバソフアブル5	丸和バイオケミカル(株) シンジエンタジャパン(株) 日産化学工業(株)	キャベツ	コナガ アオムシ ヨウムシ ハスモンヨトウ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30x60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注		
			ハイマダラノメイガ	2000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布		
		はくさい	コナガ アオムシ ヨウムシ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30x60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注		
				2000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布		
		レタス	ナモグリバエ ハスモンヨトウ オオタバコガ カブラヤガ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30x60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注		
				ナモグリバエ	1000~2000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	3回以内		散布
				ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨウムシ	2000倍		収穫3日前まで	3回以内		散布
		ブロッコリー	コナガ、アオムシ	2000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布		
		トマト	トマトハモグリバエ	1000~2000倍		収穫前日まで	3回以内			
		きゅうり	トマトハモグリバエ	100~200倍	1株当り25ml	育苗期後半~定植当日	1回	灌注		
				1000~2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布		
		なす	トマトハモグリバエ	100倍	1株当り25ml	育苗期後半~定植当日	1回	灌注		
				1000~2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
		ハスモンヨトウ	2000倍	収穫前日まで		2回以内				
		いちご	ハスモンヨトウ	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布		
		ねぎ	シロイチモジヨトウ							
		だいず	ハスモンヨトウ	4000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
		えだまめ				収穫3日前まで				
サムコルフアブル10	丸和バイオケミカル(株) アグロカネショウ(株) 三井化学アグロ(株)	りんご	シンクイムシ類	2500~5000倍	200~700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布		
			ハマキムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	5000倍						
		おうとう	アメリカシロヒトリ	2500倍						
		すもも	シンクイムシ類	2500倍						
		なし	シンクイムシ類	5000倍						
		もも、ネクタリン	シンクイムシ類、モモハモグリガ	5000倍					2回以内	